

Mustang Forte™ 195 SE

HERBICYD

Uniwersalny herbicyd wiosenny do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach

Doskonały w technologii podstawowej oraz na zabiegi poprawkowe



Optymalne rozwiązanie w technologii podstawowej oraz dawce obniżonej na zabiegi poprawkowe

Teraz siła Mustanga
w mniejszej dawce.

RECEPTA

Zastosowanie:
wiosenna poprawka

Mustang Forte™ 195 SE

Zalecenie:
0,8 l na 1 ha

Mustang Forte™ 195 SE to uniwersalny herbicyd opracowany specjalnie do powschodowego, wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

Zaprojektowany po to, aby skutecznie zwalczać wszystkie uciążliwe chwasty mające znaczenie gospodarcze dzisiaj, jak również te, które mogą stanowić problem w przyszłości.

Dawki i terminy zabiegu. Uniwersalność

ZBOŻA OZIME – OCHRONA „POPRAWKOWA”


Po jesiennym zabiegu herbicydowym w zbożach ozimych, wiosną zazwyczaj nie ma potrzeby dokonania korekty zwalczającej miotłę zbożową, ponieważ większość preparatów skutecznie likwiduje tę roślinę niepożądaną. Przeprowadza się wtedy najczęściej zabiegi poprawkowe służące wyeliminowaniu pozostałych na polu chwastów dwuliściennych, takich jak: przytulia czepna, chaber bławatek, chwasty rumianowate, mak polny czy samosiewy rzepaku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom integrowanej ochrony roślin, chcąc ułatwić Państwu wybór skutecznego i ekonomicznego preparatu, zalecamy w zabiegach poprawkowych użycie niższej dawki herbicydu **Mustang Forte™ 195 SE: 0,8 l/ha**.

Wyniki badań potwierdziły wysoką skuteczność preparatu **Mustang Forte™ 195 SE** w dawce **0,8 l/ha** na: przytulię czepną, chabra bławatka, chwasty rumianowate, mak polny, samosiewy rzepaku, gwiazdnicę pospolitą, tasznik pospolity, tobołki polne.

ZBOŻA OZIME – OCHRONA PODSTAWOWA

Jeżeli jesienią nie użyto żadnego preparatu i cała ochrona zbóż ozimych przeciwko chwastom dwuliściennym ma miejsce wiosną, należy zastosować pełną dawkę preparatu **Mustang Forte™ 195 SE: 1 l/ha**. **Mustang Forte™ 195 SE** w dawce **0,8 l/ha** należy stosować wiosną jako zabieg poprawkowy po herbicydzie jesiennym. Termin zabiegu bez kompromisu – od fazy początku krzewienia aż do fazy 2. kolanka zbóż ozimych.

Rys. 1. Zboża ozime (pszenica, pszenżyto, żyto) – warianty stosowania



ZBOŻA JARE


Rys. 2. Zboża jare (jęczmień, pszenica, owies, mieszanka jęczmienia z owsem) – dawka i termin aplikacji



Optymalnie dopasowana dawka 0,8 l/ha niezależna od rodzaju i stanu zachwaszczenia.

Termin zabiegu: od fazy 4 liścia aż do fazy 2. kolanka zbóż jarych.

Temperatura. Elastyczność



Mustang Forte™ 195 SE zwalcza chwasty już od 5°C (taka minimalna temperatura dobową powinna utrzymywać się przez 6 kolejnych dni po zabiegu).

Mieszanki

Doskonała mieszalność z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową i innymi środkami ochrony roślin stosowanymi w fazie krzewienia i początku strzelania w źdźbło zbóż:

Pszenica ozima – środki chwastobójcze: chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	Mustang Forte™ 195 SE + Nomad™ 75 WG 120 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha
	Mustang Forte™ 195 SE + Atlantis* 12 OD 0,45 l/ha
	Mustang Forte™ 195 SE + Attribut* 70 WG 60 g/ha
	Mustang Forte™ 195 SE + Apyros** 75 WG 13,3 g/ha
Pszenica ozima – środki zapobiegające wyleganiu zbóż	Mustang Forte™ 195 SE + Antywylegacz Płynny*** 675 SL 2,0 l/ha
	Mustang Forte™ 195 SE + Moddus**** 250 EC 0,4 l/ha
Pszenica ozima – środki grzybobójcze	Mustang Forte™ 195 SE + ATLAS™ 500 SC 0,2-0,3 l/ha
	Mustang Forte™ 195 SE + Input* 460 EC 1,0 l/ha
	Mustang Forte™ 195 SE + Mirage*** 450 EC 1,0 l/ha
Pszenica ozima – nawozy dolistne	Mustang Forte™ 195 SE + Siarczan Magnezu Jednowodny***** 2,5% stężenia cieczy roboczej

Uwaga!

Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych przestrzegaj zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny.

Zwalczane chwasty



Objawy działania na chwastach

Chwasty przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (żółknięcia) widoczne najczęściej

po 7–10 dniach, prowadzące do zamierania chwastów. W warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.



Bezpieczeństwo roślin

Podwójna dawka (przypadkowe nałożenie preparatu) **Mustang Forte™ 195 SE** zastosowana w optymalnych warunkach pogodowych do fazy 2. kolanka zbóż nie powoduje uszkodzeń i nie wpływała ujemnie na wysokość i jakość plonu w doświadczeniach rejestracyjnych.

Następstwo roślin

Mustang Forte™ 195 SE – wiele możliwości!
Po zastosowaniu herbicydu wiosną i po zbiorze plonu MOŻESZ zasiać/zasadzić:

- jesienią: **zboża, rzepak ozimy, gorczycę** na poplon, kapustę z rozsady, trawy,
- wiosną: **zboża jare, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki**, sorgo, rzepak jary, gorczycę, słonecznik, cebulę z siewu, marchew, sałatę z rozsady, kapustę, kalafior, brokuł i inne rośliny kapustne, trawy.

Słomę ze zbóż opryskanych produktem MOŻESZ użyć jako paszę oraz ściólkę dla zwierząt lub pozostawić na polu i przyorać.

Słoma z roślin opryskanych środkiem nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), warzyw, np. pomidora, papryki, roślin dyniowatych, sałaty i innych.



Obornik ze zbóż opryskanych herbicydem MOŻESZ wywieźć tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych (należy go wywieźć i bezpośrednio po tym wymieszać z glebą). Jeśli stosujesz obornik pod buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe, słonecznik, pomidory, paprykę, ogórki i rośliny dyniowate, sałatę, tytoń, marchew, pietruszkę i inne warzywa, wywieź go i wymieszaj z glebą minimum 6 miesięcy przed ich uprawą.

W sprawie następstwa roślin dla innych upraw należy zapoznać się ze szczegółowym opisem na etykiecie-instrukcji stosowania lub skontaktować się z przedstawicielem Corteva Agriscience™.

Mustang Forte™ 195 SE - najlepszy wybór!

- efektywne i ekonomiczne rozwiązanie przy ochronie podstawowej oraz jako zabieg „poprawkowy”
- wyjątkowo szerokie spektrum i najwyższa skuteczność na chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych i jarych
- brak konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami na chwasty dwuliścienne
- bezpieczeństwo dla zbóż ozimych i jarych
- opakowania dopasowane do różnej powierzchni zbóż w gospodarstwie
- doskonała mieszalność z innymi preparatami
- najbardziej uniwersalny produkt do ochrony zbóż ozimych i jarych!

